

# 重症度分類表

患者データ解析用重症度換算表(15歳以下)

		治療ステップ			
		治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
	気管支喘息 小児(15歳以下)の重症度分類	吸入ステロイドの使用なし かつ 経口ステロイド(維持)の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	吸入ステロイド(低用量)の使用有 かつ 経口ステロイド(維持)の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	吸入ステロイド(中用量)の使用有 かつ 経口ステロイド(維持)の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	下記のうちいずれか1つ以上を満たす ①吸入ステロイド(高用量)の使用有 ②経口ステロイド(維持)の使用有 ③抗IgE抗体の使用有
最近1年間の症状	<b>間欠型</b> 1. なし 2. 年に数回	間欠型	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型
	<b>軽症持続型</b> 3. 1回/月以上、1回/週未満	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型	重症持続型
	<b>中等症持続型</b> 4. 1回/週以上、1回/日未満	中等症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型
	<b>重症持続型</b> 5. 毎日/生活に制限なし 6. 毎日/生活に制限あり	重症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型

患者データ解析用重症度換算表(16歳以上)

		治療ステップ			
		治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
	気管支喘息 成人(16歳以上)の重症度分類	吸入ステロイドの使用なし かつ 経口ステロイド(維持)の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	吸入ステロイド(低用量)の使用有 かつ 経口ステロイド(維持)の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	吸入ステロイド(中用量)の使用有 かつ 経口ステロイド(維持)の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	下記のうちいずれか1つ以上を満たす ①吸入ステロイド(高用量)の使用有 ②経口ステロイド(維持)の使用有 ③抗IgE抗体の使用有
最近1年間の症状	<b>コントロールされた状態及び軽症間欠型相当</b> 1. なし 2. 年に数回 3. 1回/月以上、1回/週未満	軽症間欠型	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型
	<b>軽症持続型相当</b> 4. 1回/週以上、1回/日未満	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型	重症持続型
	<b>中等症持続型相当</b> 5. 毎日/生活に制限なし	中等症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型
	<b>重症持続型相当</b> 6. 毎日/生活に制限あり	重症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型

\* 最重症持続型を区別できる分類とした。