


人口10万人当たりがんによる75歳未満年齢調整死亡率の推移（東京都）

資料 人口動態統計による都道府県別がん死亡データ
 [国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」]



- 人口10万人当たりがんによる75歳未満年齢調整死亡率は、男女とも減少傾向にあるものの、女性は令和2年に増加に転じている


参考図表（がん）

人口10万人当たりがんによる75歳未満年齢調整死亡率の推移（東京都）


資料 人口動態統計による都道府県別がん死亡データ
[国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」]

図表

部位別・男性



部位別・女性




■ 人口10万人当たり
がんによる年齢調整死亡率は、
女性の子宮がんで増加している

参考図表（がん）

がん検診対象者の受診機会の内訳の推移（平成22年度・平成27年度・令和2年度調査 東京都）

資料 健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査 [東京都福祉保健局]

図表



(注) 胃がん検診は、H22・27は40歳以上をがん検診の対象者としているが、R2は50歳以上をがん検診の対象者としている


- 区市町村が実施するがん検診対象者の割合は、5がんともに減少している一方で、職域で検診機会がある者の割合は、5がんともに増加傾向にある

参考図表（糖尿病・メタボリックシンドローム）

特定健康診査の対象者数、受診者数、実施率の推移（東京都全体）

資料 レセプト情報・特定健康診査等情報データ [厚生労働省]

図表




- 令和元年は、平成30年と比べて、対象者が増える一方で、受診者数が減っており、実施率が減となっている

参考図表（糖尿病・メタボリックシンドローム）

特定保健指導の対象者数、終了者数、実施率の推移（東京都全体）

資料 レセプト情報・特定健康診査等情報データ [厚生労働省]

図表





- 特定保健指導の対象者数は、増加傾向にある
- 特定保健指導の終了者数も増加傾向にあるものが、令和元年の実施率は、平成30年と比べて、0.1ポイント減となっている

参考図表（糖尿病・メタボリックシンドローム）

特定保健指導実施率の比較（平成22年・平成27年・令和元年比較 東京都全体）

資料 レセプト情報・特定健康診査等情報データ [厚生労働省]

図表







- 令和元年の実施率を見ると、45～64歳男性は20%を超えているが、65～74歳男性は15%前後にとどまる
- 令和元年の女性の実施率は15%前後で、ほぼ全ての年代で男性より低い傾向にある
- 平成22年と比べると、令和元年の実施率は男女とも全ての年代で高くなっているが、平成27年と比べると、男性の70～74歳及び女性の65～74歳は、令和元年の実施率が低くなっている

参考図表（糖尿病・メタボリックシンドローム）

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合の推移と変化幅（平成22年・平成27年・令和元年比較 東京都全体）

資料 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 [厚生労働省]

図表





■ 男性の40～45歳、女性の70～74歳を除き、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は平成22年と令和元年を比べると増加傾向にある

参考図表（循環器疾患）

人口10万人当たり脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の推移（東京都・全国）

資料 人口動態統計特殊報告〔厚生労働省〕

図表



〈脳血管疾患の年齢調整死亡率〉

- 国・都ともに男女とも減少している
- 男女ともに国に比べて都が低くなっている

〈虚血性心疾患の年齢調整死亡率〉



- 国・都ともに男女とも減少している
- 男女ともに国に比べて都が高くなっているが、その差は小さくなっている

参考図表 (COPD)

COPDの認知度の推移 (平成24年1月・平成28年10月・令和3年6月比較 東京都 20歳以上)

資料 健康に関する世論調査 [東京都生活文化局]

図表




- COPDの認知度は、どの年代も男性より女性の方が、認知度が高くなっている
男女とも、高齢になるほど、認知度が高くなっている
- 男性は、20～60歳代において、平成24年に比べて、令和3年の認知度が低くなっている

参考図表 (COPD)

COPDの認知度<喫煙の習慣別> (令和3年6月 東京都 20歳以上)

資料 健康に関する世論調査 [東京都生活文化局]

図表




- COPDの認知度は、「ときどき吸う日がある」、「毎日吸っている」の順に高くなっている

参考図表 (COPD)

喫煙習慣見直しの意向 (令和3年6月 東京都 20歳以上)

資料 健康に関する世論調査 [東京都生活文化局]

図表



- 喫煙者のうち、喫煙習慣を見直したいと考えている人が約6割いる